

Sumário

Atos do Chefe do Poder Executivo 01

Atos do Chefe do Poder Executivo

REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ-TO torna público que fará realizar: PREGÃO PRESENCIAL SRP-006/2019 “MENOR PREÇO GLOBAL” com abertura prevista para o dia 16/09/2019 às 09h00min, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITACAJÁ-TO, em tratamento dentro do Estado do Tocantins, nos termos e condições constantes no Edital e seus anexos, O edital poderá ser obtido na sala da CPL nos dias úteis das 07h30 às 13h30. Mais informações (63) 3439 1411.

Itacajá – TO, 23 de agosto de 2019.

Marcelino Correia Soares Junior
Pregoeiro



Diário Oficial Eletrônico do Município de Itacajá

Prefeitura Municipal de Itacajá

Avenida Paulo Falcão Teixeira, 403 – Centro –

CEP 77720-000 – Itacajá -TO

Cleoman Correia Costa
Prefeito Municipal

Robson Carvalho da Silva Correia
Secretário de Administração

SE TEM INFÂNCIA, TEM VACINAÇÃO
CONTRA A POLIOMIELITE E O SARAMPO

Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta. Saiba mais em saude.gov.br/vacineproteger

COM PROTEÇÃO, AS DOENÇAS NÃO VOLTARÃO.

TODAS AS CRIANÇAS DEVEM SER VACINADAS PARA FICAREM PROTEGIDAS.

É IMPORTANTE QUE TODOS PARTICIPEM.
Pais, mães, familiares, professores, profissionais de saúde, todos estão convidados a participarem desta campanha contra a poliomielite e o sarampo. Levem as crianças para tomarem as vacinas. Incentivem os amigos a fazerem o mesmo. Vamos combater essas doenças juntos.

COMO SE PEGA POLIOMIELITE?
A transmissão da poliomielite ocorre por contato direto de pessoa para pessoa pela via fecal-oral (mais frequentemente), por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou portadores ou ainda, pela via oral-oral, por meio de gotículas de secreções da orofaringe (ao falar, tossir ou espirrar). A única forma de prevenção é por meio da vacina.

É O SARAMPO?
A transmissão do sarampo ocorre de forma direta por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Por isso, a elevada contagiosidade da doença. É fácil pegar, mas é mais fácil ainda se prevenir. Basta ir até a unidade de saúde e vacinar as crianças.

DE 6 A 31 DE AGOSTO

TODAS AS CRIANÇAS DE 1 A MENORES DE 5 ANOS DE IDADE DEVEM TOMAR AS VACINAS, MESMO AS QUE JÁ TENHAM SIDO VACINADAS.